

⑥

MR I 検査を受けられる患者様へ(注 意 書)

☆ 検査ができるかどうかの確認

1. MR I ができない
心臓ペースメーカー・人工内耳を使用
妊婦あるいは妊娠の可能性ある、強度の閉所恐怖症
2. できない可能性がある
体内金属、義眼、刺青がある、歯科インプラント、アートメイク※
※MR I ができるかどうかいれられた所にお尋ねください。

☆ 検査前

- 単純MR I 検査：検査のための食事・飲水制限はありません。
- 造影MR I 検査：検査前の一食（午前の検査であれば朝食・午後の検査であれば昼食）を抜いて下さい。水分（水・お茶等）は検査1時間前まで自由におとり下さって結構ですが、水分制限のある方は主治医の指示に従って下さい。絶食時には血糖降下剤は服用しないで下さい。その他内服薬の服用については、担当医の指示に従って下さい。
- 検査衣に着替えていただきます。
- コンタクトレンズ・入れ歯は外せるようにケースや保存液をご準備下さい。
- 磁気カードや金属類、補聴器は検査室には持ち込めません。
- マスカラ・ラメ入り化粧品（マニキュア含む）や貼り薬（湿布・ニトロダーム等）、エレキバンは火傷の原因になります。取り除いて検査をお受け下さい。またネイルアート（スカルプチュアやジェルネイル等）取り外し困難なつけ爪については、検査ができない場合があります。

☆ 検査中

- 大きな音がします。うるさく感じられるかもしれませんが、体を動かさないように注意して下さい。
- 伝えたいことがあったら、手元のプザーを押して担当者を呼んで下さい。

☆ 検査後（造影MR I 検査を受けられた方のみ）

- 検査で使用した造影剤は、尿として排泄されますので、検査後はいつもより多めに水分をおとり下さい。ただし、食事制限や水分制限を受けている方は、担当医の指示に従って下さい。
- 造影剤の一部は乳汁中にも移行しますので、24時間は授乳を避けて下さい。