

# 【参考資料】PPI注射剤 Drug Information

	オメプラゾール注用20mg「NP」	タケプロン静注用30mg
効能効果	経口投与不可能な下記の疾患 ○出血を伴う胃潰瘍 ○十二指腸潰瘍 ○急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変 経口投与不可能なZollinger-Ellison症候群	経口投与不可能な下記の疾患 ○出血を伴う胃潰瘍 ○十二指腸潰瘍 ○急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変
用法用量	1回20mg、1日2回	1回30mg、1日2回
投与経路	点滴静注または緩徐に静注	点滴静注または緩徐に静注
薬価	¥228.0	¥409.0
併用禁忌	アタザナビル、リルピピリン	アタザナビル、リルピピリン
併用注意	ジアゼパム フェニトイン タクロリムス ジゴキシシン イトラコナゾール ゲフィチニブ メトトレキサート シロスタゾール ワルファリン エルロチニブ ポリコナゾール ネルフィナビル サキナビル クロピドグレル セイヨウオトギリソウ	ジアゼパム フェニトイン タクロリムス ジゴキシシン イトラコナゾール ゲフィチニブ メトトレキサート テオフィリン
代謝酵素	CYP2C9および3A4	CYP2C9および3A4