

Drug Information News (2021年10月)

八尾市立病院 医薬品情報管理室



1. 八尾市立病院の医薬品採用状況（2021年8月薬事委員会承認分）
2. 効能等追加承認情報
3. 保険適用される公知申請品目に関する情報

1. 八尾市立病院の医薬品採用状況（2021年8月薬事委員会承認分）

【採用医薬品】（院内・院外ともに処方できます。）

- ピペリデン塩酸塩錠 1mg「ヨソミ」（院外処方では、一般名処方です。）
- テモダール点滴静注用 100mg
- ポライビー点滴静注用 30mg・140mg

【特定患者用医薬品】（事前に薬剤部への連絡が必要です。）

- ソマチユリン皮下注 120mg
- ヌーカラ皮下注用 100mg
- ロナブリーブ点滴静注セット 300・1332
- ジムソ膀胱内注入液 50%

【院外処方専用医薬品】（院外処方でのみ、処方できます。）

- アルンプリング錠 30mg・90mg
- 炭酸水素ナトリウム錠 500mg（一般名処方です。）
- マスーレッド錠 5mg・12.5mg・25mg・75mg
- エナジア吸入用カプセル中用量・高用量
- ゼビアックス油性クリーム 2%〔1本 10g〕
- ペピオゲル 2.5%〔1本 15g〕

【採用区分変更：特定→採用】

- ガバベン錠 200mg
- 抗Dグロブリン筋注用 1000倍「ニヤウ」
- フェノバル注射液 100mg

【採用区分変更：院外→採用】

- アシクロビル錠 200mg「ファイザ-」（院外処方では、一般名処方です。）
（※現在、出荷調整中のため供給が不安定です。）
- カモスタットメシル酸塩 100mg「NP」（院外処方では、一般名処方です。）
（※現在、出荷調整中のため供給が不安定です。）
- コントミン糖衣錠 12.5mg
- サムチレール内用懸濁液 15%
- ダーブロック錠 2mg・4mg
- チアプリド錠 25mg「サイ」（院外処方では、一般名処方です。）
- ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔1包 2.5g〕
- デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」（院外処方では、一般名処方です。）

【採用区分変更：院外→特定】

- タペンタ錠 25mg

【採用区分変更：採用→院外】（院内在庫がなくなり次第、院内採用を取り消します。）

- アクアチムローション 1%（院外処方では、一般名処方です。）

【剤形変更（同一成分・同一含量・同一薬価）】

- テネリア錠 20mg ⇒ テネリア OD 錠 20mg

【メーカー変更（同一成分・同一含量）】（理由：供給問題のため）

- テグレート錠 200mg ⇒ カルバマゼピン錠 200mg「アム」
- テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「サイ」 ⇒ テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「タイ-」

【採用取り消し】（院内在庫がなくなり次第、採用を取り消します。）

- ソバルディ錠 400mg
- アドベイト静注用 250・500・1000・1500・2000
- ノボセブンH I 静注用 1mg・2mg・5mg シリンジ
- ペチジン塩酸塩注射液 50mg「タガ」
- カデックス外用散 0.9%
- ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg

【後発医薬品への切り替え】（院内在庫調整のうえ、切り替えを行います。）

- デノシン点滴静注用 500mg ⇒ ガンシクロビル点滴静注用 500mg「ファイザ-」
- アロキシ静注 0.75mg ⇒ パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイウ」
- ベシケア錠 5mg ⇒ ソリフェナシニコハク酸塩 OD 錠 5mg「ト-」
（院外処方では、一般名処方です。）
- サインバルタカプセル 20mg ⇒ デュロキセチン OD 錠 20mg「ニフ」
（院外処方では、一般名処方です。）
- ザクラス配合錠 HD ⇒ ジルムロ配合 OD 錠 HD「ト-」
（院外処方では、一般名処方です。）

2. 効能等追加承認情報

承認日	製品名	一般名	会社名	備考
2021/8/25	アブラキサ点滴静注用 100mg	パクリタキセル	大鵬薬品	乳癌に対するテセントリクとの併用療法から他の抗悪性腫瘍剤との併用療法に変更する用法等追加
2021/8/25	イヌリード注	イヌリン	富士薬品	糸球体過剰の測定による腎機能検査に対する18歳以下の用法等追加
2021/8/25	ウブトラビ錠 0.2mg、 同錠 0.4mg	セレキシパグ	日本新薬	外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する効能追加
2021/8/25	オブジーボ点滴静注 20mg、同点滴 静注 100mg、 同点滴静注 120mg、同点滴静注 240mg	ニボルマブ（遺伝 子組換え）	小野	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対するカボメティクス錠との併用療法を追加する用法等追加
2021/8/25	カボメティクス錠 20mg	カボザンチニプリング 酸塩	武田	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対するオブジーボ点滴静注との併用療法の用法等追加
2021/8/25	カルボプラチン点滴静注液 50mg 「NK」、 同点滴静注液 150mg「NK」、 同点滴静注液 450mg「NK」	カルボプラチン	マイラン＝日 本化薬	乳癌に対するキイトルーダ点滴静注とゲムシダピンとの併用療法を追加する用法等追加
2021/8/25	キイトルーダ点滴静注 100mg	ペムブロリズマブ （遺伝子組換え）	MSD	治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌に対する効能追加 PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌に対する効能・用法等追加
2021/8/25	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝 子組換え）、ボルヒ アルロニダーゼ アル ファ（遺伝子組換 え）	ヤンセン	全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法等追加 ベルケイド注射用、注射用エンドキサン・エンドキサン錠、デカロン錠との併用療法
2021/8/25	デカロン錠 0.5mg、 同錠 4mg	デキサメタゾン	日医工	全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法等追加 ダラキューロ配合皮下注、ベルケイド注射用、注射用エンドキサン・エンドキサン錠との併用療法
2021/8/25	ニトプロ持続静注液 6mg、 同持続静注液 30mg	ニトロプルシドナトリ ウム水和物	丸石	急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）、高血圧性緊急症に対する小児の効能・用法等追加
2021/8/25	フェントステーブ 0.5mg、同テーブ 1mg、 同テーブ 2mg、同テーブ 4mg、 同テーブ 6mg、同テーブ 8mg	フェンタニルクエン酸 塩	久光＝協和 キリン	非オピオイド鎮痛剤で治療困難な中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛（ただし、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る。）に対する小児の効能・用法等追加
2021/8/25	フォンーガ錠 5mg、 同錠 10mg	ダバグリフロジンプロ ピレングリコール水 和物	アストラゼネカ ＝小野	慢性腎臓病に対する効能追加

2021/8/25	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	ブスルファン	大塚製薬	同種造血幹細胞移植の前治療、ユーイング肉腫ファミリー腫瘍及び神経芽細胞腫における自家造血幹細胞移植の前治療に対する小児の用法等追加
2021/8/25	ヘルケイド注射用 3mg	ボルテゾミブ	ヤンセン	全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法等追加 ダラキューロ配合皮下注、注射用エンドキサン・エンドキサン錠、デカロン錠との併用療法
2021/8/25	リクシアナ錠 15mg、 同 OD 錠 15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	第一三共	非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制に対する用法等追加 出血リスクの高い高齢の非弁膜症性心房細動患者への用量追加
2021/8/25	リンヴォック錠 7.5mg、 同錠 15mg	ウパダシチニブ水和物	アヅビィ	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に対する効能・用法等追加
2021/8/25	注射用エンドキサン 100mg、 注射用同 500mg、 エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	塩野義	全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法等追加 ダラキューロ配合皮下注、ヘルケイド注射用、デカロン錠との併用療法

3. 保険適用される公知申請品目に関する情報

要望された医薬品			追加又は変更予定の効能・効果（該当箇所）	追加又は変更予定の用法・用量	保険適用日
一般名	販売名	会社名			
乾燥人フィブリノゲン	フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」	一般社団法人 日本血液製剤機構	産科危機的出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症に対するフィブリノゲンの補充	注射用水に溶解し、1 回 3g を静脈内投与する。投与後に後天性低フィブリノゲン血症が改善されない場合は、同量を追加投与する。	2021/9/6
グラニセトロン塩酸塩	カイトリル注 1mg、同注 3mg、同点滴静注バッグ 3mg/50mL、同点滴静注バッグ 3mg/100 mL	太陽ファルマ株式会社	術後の消化器症状（悪心、嘔吐）	通常、成人にはグラニセトロンとして 1 回 1mg を静注又は点滴静注する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1 日 3mg までとする。	2021/8/30
オンダンセトロン塩酸塩水和物	オンダンセトロン注 4mg シリンジ「マルイシ」	丸石製薬株式会社	術後の消化器症状（悪心、嘔吐）	成人：通常、成人にはオンダンセトロンとして 1 回 4mg を緩徐に静脈内投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 小児：通常、小児にはオンダンセトロンとして 1 回 0.05～0.1mg/kg（最大 4mg）を緩徐に静脈内投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	2021/8/30