

Drug Information News (平成 26 年 8 月)

八尾市立病院 医薬品情報管理室

1. 八尾市立病院の医薬品採用状況(平成 26 年 6 月薬事委員会承認分)
2. 製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ
3. 効能等追加承認情報(2014 年)

1. 八尾市立病院の医薬品採用状況(平成 26 年 6 月薬事委員会承認分)

(1) 採用医薬品:院内・院外ともに処方可能な医薬品です。

- エネーボ配合経腸用液
- エフィエント錠 3.75mg/5mg
- エルカルチンFF内用液 10%
- フォシーガ錠 5mg
- ラベタロール塩酸塩錠 50mg「トロー」
- イオパーク 350 注シリンジ 100mL
- エルカルチンFF静注 1000mg
- オイパロミン 370 注 50mL/100mL
- カドサイラ点滴静注用 100mg/160mg
- PA・ヨード点眼・洗眼液

(2) 特定患者用医薬品:処方時、事前に薬剤部への連絡が必要な医薬品です。

- イクスタンジカプセル 40mg
- ジオトリフ錠 20mg/30mg/40mg/50mg
- ロンサーフ配合錠T15/T20

(3) 院外処方専用医薬品:院外処方せんでのみ処方可能な医薬品です。

- ザルティア錠 5mg
- スーグラ錠 50mg
- ビオチン散 0.2%「フー」(院外専用かつ特定患者用です。)
- ペンタサ坐剤 1g

(4) 院外処方専用へ採用区分を変更します。

- アズロキサ顆粒 2.5%
- ハイペン錠 200mg
- パンクレアチン「ヒシヤマ」
- ファロム錠 200mg

(5) 採用を取り消します。

- エルカルチン錠 100mg
- ペンタジン錠 25mg
- バクトロバン鼻腔用軟膏 2%
- フルタイド 50 ロタディスク
- アンスロピンP500 注射用
- ズファジラン筋注 5mg
- フェノバル注射液 100mg

2. 製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ

● メルカゾールによる無顆粒球症について

メルカゾール(以下、本剤)投与による無顆粒球症については、既に注意喚起を行っていますが、国内の副作用発現状況を踏まえ、改めて適正使用のお願いをいたします。

無顆粒球症等の副作用を早期発見し、重篤化を防ぐため、本剤を処方される際は以下の事項を遵守して下さい。

- 投与開始・再開初期の少なくとも2ヶ月間は、原則として2週に1回、それ以降も定期的に白血球分画を含めた血液検査を実施してください。
- 無顆粒球症の初期症状(発熱、全身倦怠、咽頭痛等)があらわれた場合には、白血球分画を含めた検査を行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行ってください。
- 顆粒球の減少傾向等の異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行ってください。
- 患者さんに対して、顆粒球(好中球)の減少から易感染状態となり、敗血症等により重篤な転帰に至る場合があることを説明するとともに、下記の点を指導してください。
 - ✓ 定期的な血液検査を行う必要があるため、受診日を守って通院すること。
 - ✓ 無顆粒球症の初期症状(のどの痛み、発熱等)があらわれた際には、直ちに主治医を受診すること。
 - ✓ 主治医以外の医療機関を受診する場合には、本剤を服用していることを医師に告げること。

3. 効能等追加承認情報(2014年)

製品名	会社名	一般名	備考	承認日
ミレーナ 52mg	バイエル	レボノルゲストレル	過多月経の効能追加	2014/6/20
フェントステープ 1mg 同テープ 2mg 同テープ 4mg 同テープ 6mg 同テープ 8mg	久光＝協和発酵キリン	フェンタニルクエン酸塩	中等度から高度の慢性疼痛の効能追加	2014/6/20
プレバナー13 水性懸濁注	ファイザー＝武田	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	高齢者への適応拡大	2014/6/20
ファイバ注射用 500 同注射用 1000	バクスター	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性化複合体	定期的投与による出血予防に関する効能等追加	2014/6/20
ネクサバル錠 200mg	バイエル	ソラフェニプトシル酸塩	根治切除不能な分化型甲状腺癌の効能追加	2014/6/20
献血グロベニン-I静注用 500mg 同静注用 2500mg 同静注用 5000mg	日本製薬＝武田	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症(ステロイド剤の効果不十分な場合)の効能追加	2014/7/4