

【参考資料】5-HT3拮抗薬（経口剤） Drug Information

	オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」	ナゼアOD錠0.1mg
効能効果	抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）	抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）
用法用量	1回4mg、1日1回経口投与	1回0.1mg、1日1回経口投与
	癌化学療法各クールにおいて、本剤の投与期間は3～5日間を目安とする。	癌化学療法各クールにおいて、本剤の投与期間は5日間以内とする。
剤形	口腔内崩壊錠	口腔内崩壊錠
薬価	¥509.0	¥1,019.5
併用禁忌	なし	なし
併用注意	<ul style="list-style-type: none"> ●CYP3A4を誘導する作用を有する薬剤（フェニトイン、カルバマゼピン、リファンピシン等） →オンダンセトロン作用減弱 ●トラマドール →トラマドールの鎮痛作用減弱 ●セロトニン作用薬 →セロトニン作用増強のおそれ ●選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） →セロトニン作用増強のおそれ ●セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（SNRI） →セロトニン作用増強のおそれ ●MAO阻害剤 →セロトニン作用増強のおそれ ●アポモルヒネ 	<ul style="list-style-type: none"> ●フルボキサミン→ナゼアの血中濃度上昇
代謝酵素	CYP3A4、CYP2D6、CYP1A2	CYP1A2、CYP2D6