

# Drug Information News (2021年3月)

八尾市立病院 医薬品情報管理室



1. 八尾市立病院の医薬品採用状況 (2021年2月薬事委員会承認分)
2. 製造販売承認情報
3. 効能等追加承認情報
4. 医薬品の取り換え注意
5. 保険適用される公知申請品目に関する情報

## 1. 医薬品・八尾市立病院の医薬品採用状況 (2021年2月薬事委員会承認分)

### 【採用医薬品】(院内・院外ともに処方できます。)

- イグザレルト OD 錠 10mg・15mg (普通錠から口腔内崩壊錠へ切り替え)
- スルバシリン静注用 3g

### 【特定患者用医薬品】(事前に薬剤部への連絡が必要です。)

- アイクルシグ錠 15mg
- デュピクセント皮下注 300mg ペン (シリンジ製剤から切り替え)
- モゾビル皮下注 24mg

### 【院外処方専用医薬品】(院外処方でのみ処方できます。)

- エクフィナ錠 50mg

### 【採用区分変更：採用→院外】

- ヘパン ED 配合内用剤
- レクサプロ錠 10mg
- ロトリガ粒状カプセル 2g
- 眼・耳科用リンデロン A 軟膏
- セレクトール錠 100mg → 一般名処方に変更：【般】セリプロロール塩酸塩錠 100mg
- ビソルボン錠 4mg → 一般名処方に変更：【般】プロムヘキシシ塩酸塩錠 4mg
- メキシチールカプセル 100mg → 一般名処方に変更：【般】メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg

### 【メーカー・剤形・製剤の変更 (同一成分・同一含量)】

- ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg・10mg「FY」 ⇒ ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg・10mg「ツイ」
- ナフトピジル錠 25mg「あすか」 ⇒ ナフトピジル OD 錠 25mg「トワ」
- ボグリボース錠 0.2mg「MEEK」 ⇒ ボグリボース錠 0.2mg「武田®」
- クラリスロマイシン錠 200「MEEK」 ⇒ クラリスロマイシン錠 200mg「トワ」
- クラリスロマイシン錠 50 小児用「MEEK」 ⇒ クラリスロマイシン錠小児用 50mg「トワ」
- アネトカインビスカス 2% ⇒ リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」
- アネトカインゼリー 2% ⇒ キシロカインゼリー 2%
- プランルカスト錠 112.5「EK」 ⇒ プランルカストカプセル 112.5mg「トワ」

【採用取り消し】（院内在庫がなくなり次第、採用を取り消します。）

- イグザレルト錠 10mg・15mg（口腔内崩壊錠へ切り替え）
- ナルサス錠 24mg
- パシーフカプセル 60mg
- スルバシリン静注用 1.5g
- デュピクセント皮下注 300mg シリンジ（ペン製剤へ切り替え）
- エアーサロンパス（販売中止）

【その他】

- コミナティ筋注
- ラビジェル（500mL）

2. 製造販売承認情報

承認日	製品名	一般名	会社名	備考	薬価収載日
2021/2/14	コミナティ筋注	コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2） （有効成分名：トジナメラン）	ファイザー	ウイルスワクチン類	
2021/1/22	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター、 同皮下注 120mg シリンジ	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	リリー＝第一三共	ヒト化抗 CGRP モノクローナル抗体製剤	
2021/1/22	ソグルーヤ皮下注 5mg、 同皮下注 10mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	ノボ	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤	
2021/1/22	ジムソ膀胱内注入液 50%	ジメチルスルホキシド	杏林	間質性膀胱炎治療剤	
2021/1/22	イグザレルトドライシロップ小児用 51.7mg、 同ドライシロップ小児用 103.4mg	リバーロキサバン	バイエル	選択的 direct 作用型第 Xa 因子阻害剤	
2021/1/22	ノベルジン顆粒 5%	酢酸亜鉛水和物	ノーベル	<報告品目> ウィルソン病治療剤（銅吸収阻害剤）・低亜鉛血症治療剤	
2021/1/22	ヒュンターゼ脳室内注射液 15mg	イデュルスルファーゼ ベータ（遺伝子組換え）	クリニジェン	ムコ多糖症 II 型治療剤	
2021/1/22	アタリムマブ BS 皮下注 20mg シリンジ 0.4mL「第一三共」、 同 BS 皮下注 40mg シリンジ 0.8mL「第一三共」、 同 BS 皮下注 40mg ペン 0.8 mL「第一三共」	アタリムマブ（遺伝子組換え） 【アタリムマブ後続 2】	第一三共	<報告品目> ヒュミラのバイオ後続品	
2021/1/22	エドルミズ錠 50mg	アナモレリン塩酸塩	小野	グレリン様作用薬	
2021/1/22	マスーレド錠 5mg、 同錠 12.5mg、同錠 25mg、 同錠 50mg、同錠 75mg	モリデュスタットナトリウム	バイエル	HIF-PH 阻害薬/腎性貧血治療薬	

承認日	製品名	一般名	会社名	備考	薬価収載日
2021/1/22	アルンブリグ錠 30mg、同錠 90mg	ブリグチニブ	武田	抗悪性腫瘍剤/チロシキナーゼ阻害剤	
2021/1/22	カルケンスカプセル 100mg	アカラブルチニブ	アストラゼネカ	抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシキナーゼ阻害剤）	
2021/1/22	オラデオカプセル 150mg	ベロトラルスタット塩酸塩	オーファンパシフィック＝鳥居	遺伝性血管性浮腫発作抑制用 血漿カリクレイン阻害剤	
2021/1/22	ヌーイック静注用 250、同静注用 500、同静注用 1000、同静注用 2000、同静注用 2500、同静注用 3000、同静注用 4000	シモクトコグ アルファ（遺伝子組換え）	藤本	遺伝子組換え型血液凝固第 VIII 因子製剤	
2021/1/22	リンスパッド点滴静注用 1000mg	乾燥濃縮人α1-プロテインゼインヒビター	オーファンパシフィック	血漿分画製剤	
2021/1/22	サルブレップ配合内用液	無水硫酸ナトリウム/硫酸カリウム/硫酸マグネシウム水和物	日本製薬＝武田	経口腸管洗浄剤	

### 3. 効能等追加承認情報

承認日	製品名	一般名	会社名	備考
2021/1/22	イグザレルト錠 10mg、同錠 15mg 同細粒分包 10mg、同細粒分包 15mg 同 OD 錠 10mg、同 OD 錠 15mg	リバーロキサバン	バイエル	静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制に対する小児の効能・用法等追加
2021/1/22	ノバルジン錠 25mg、同錠 50mg	酢酸亜鉛水和物	ノーベル	・30kg 未満の小児への開始用量を体重に応じた用量へ変更 ・10kg 未満の小児への最大投与量の用法等追加

### 4. 医薬品の取り違え注意

- 「プロスタール錠 25/プロスタール L 錠 50mg」と「プロタノール S 錠 15mg」の販売名類似による取り違え注意のお願い

（あすか製薬株式会社/興和株式会社）

<https://www.pmda.go.jp/files/000238948.pdf>

- 公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業及び薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業において、プロスタール錠/プロスタール L 錠とプロタノール S 錠の取り違え事例が、複数報告されています。
- これらの薬剤を処方又は調剤いただく際には、薬効及び販売名等を今一度ご確認ください。  
また、処方時に薬剤オーダリングシステム等をご使用の場合は、販売名の前に薬効を記載する等の予防策を検討してください。

## 5. 保険適用される公知申請品目に関する情報

要望された医薬品			追加又は変更予定の 効能・効果（該当箇所）	追加又は変更予定の 用法・用量	保険 適用日
一般名	販売名	会社名			
ブスルファン	ブスルフェクス 点滴静注用 60mg	大塚製薬株 式会社	同種造血幹細胞移植の前 治療 ユーイング肉腫ファミリー腫 瘍、神経芽細胞腫、悪性リン パ腫における自家造血幹細 胞移植の前治療  (既承認の内容から、効能・ 効果について変更はない。)	他の抗悪性腫瘍剤との併用におい て、成人には A 法又は B 法、小 児には C 法又は D 法を使用す る。なお、患者の状態により適宜減 量する。 D 法：ブスルファンとして以下の体 重別の投与量を 3 時間かけて点 滴静注する。本剤は 1 日 1 回、4 日間投与する。 (実体重：投与量) 9kg 未満：4.0mg/kg 9kg 以上 16kg 未満： 4.8mg/kg 16kg 以上 23kg 以下： 4.4mg/kg 23kg 超 34kg 以下： 3.8mg/kg 34kg 超：3.2mg/kg	2021/1/29
ミコフェノール酸 モフェチル	セルセプトカ プセル 250 及び同 懸 濁用散 31.8%	中外製薬株 式会社	造血幹細胞移植における移 植片対宿主病の抑制	成人：通常、ミコフェノール酸 モフ エチルとして 1 回 250～ 1,500mg を 1 日 2 回 12 時間 毎に食後経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減 するが、1 日 3,000 mg を上限と し、1 日 3 回食後経口投与するこ ともできる。 小児：通常、ミコフェノール酸 モフ エチルとして 1 回 300～ 600mg/m <sup>2</sup> を 1 日 2 回 12 時 間毎に食後経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減 するが、1 日 2,000 mg を上限と する。	2021/1/27
ニトロプルシドナ トリウム水和物	ニトロ持続 静注液 6mg、ニト ロ持続静注 液 30mg	丸石製薬株 式会社	急性心不全（慢性心不全 の急性増悪期を含む）、高 血圧性緊急症	通常、小児には 1 分間に体重 1kg 当たりニトロプルシドナトリウム 水和物として 0.5µg/kg/分の投 与速度で投与を開始し、過度の血 圧低下に注意しながら徐々に増量 して目的とする血行動態を得るま で循環動態をモニターしながら投与 速度を調節する。通常、 3.0µg/kg/分以下の投与速度で 目的とする血行動態が得られ、そ れを維持することができる。最高投 与速度は 10µg/kg/分を限度と する。また、開始投与速度は年 齢、症状により適宜減量する。	2021/1/27