

【参考資料】

PPI経口剤・P-CAB（疾患別）

Drug Information

		PPI（プロトンポンプ阻害薬）				P-CAB	
		ランソプラゾール		オメプラゾール	エソメプラゾール	ポノプラザン	
		ランソプラゾールOD錠 15mg【トワ】	ランソプラゾールOD錠 30mg【トワ】	オメプラゾール錠 20mg【トワ】	エソメプラゾールカプセル 20mg【コ°ロ】	タケキャブ錠10mg	タケキャブ錠20mg
効能効果	胃潰瘍	●	●	●	●	●	●
	十二指腸潰瘍	●	●	●	●	●	●
	逆流性食道炎	●	●	●	●	●	●
	吻合部潰瘍	●	●	●	●	×	×
	Zollinger-Ellison症候群	●	●	●	●	×	×
	非びらん性胃食道逆流症	●	×	×	×	×	×
	低用量アスピリン投与時における 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	●	×	●	●	●	●
	非ステロイド性炎症薬投与時における 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	●	×	●	●	●	●
	用法用量	適応症ごとに異なる					
剤形	口腔内崩壊錠		腸溶錠	カプセル	錠		
薬価	¥14.2	¥24.0	¥25.2	¥46.6	¥100.5	¥150.5	
主な代謝酵素	CYP2C19および3A4				CYP3A4		
併用禁忌	アタザナビル、リルピビルン						
併用注意	CYP3A4阻害剤（クラリスロマイシン）	-	-	-	-	●	●
	ジゴキシン	●	●	●	●	●	●
	メチルジゴキシン	●	●	●	●	●	●
	イトラコナゾール	●	●	●	●	●	●
	ゲフィチニブ	●	●	●	●	●	●
	ニロチニブ	-	-	-	●	●	●
	エルロチニブ	-	-	●	●	●	●
	ネルフィナビルメシル酸塩	-	-	●	●	●	●
	ジアゼパム	●	●	●	●	-	-
	フェニトイン	●	●	●	●	-	-
	シロスタゾール	-	-	●	●	-	-
	ワルファリン	-	-	●	●	-	-
	タクロリムス水和物	●	●	●	●	-	-
	ボリコナゾール	-	-	●	●	-	-
	サキナビルメシル酸塩	-	-	●	●	-	-
	セイヨウホトトギス（セント・ジョンズ・ワート） 含有食品	-	-	●	●	-	-
	メトトレキサート	●	●	●	●	-	-
	クロビドグレル	-	-	●	-	-	-
	テオフィリン	●	●	-	-	-	-
	ボスチニブ水和物	●	●	-	-	-	-
備考	粉砕	×		×	×	○	
		腸溶性顆粒を含む口腔内崩壊錠のため粉砕不可		腸溶性製剤のため粉砕不可	胃酸で分解されるため、顆粒に腸溶コーティングが施されているため粉砕不可	主薬が光に不安定なため、遮光の目的でフィルムコーティング錠にしている。粉砕後、温度40℃、暗所の条件下で観察した結果、3ヶ月後まで、外観、含量について特に問題となる変化なし	
	簡易懸濁	条件付通過（8Fr.） 常温の水で崩壊させ、直ちに投与		不適	条件付通過（8Fr.）	条件付通過（8Fr.） コーティングを破壊したうえで、10分後に完全に崩壊	