

【参考資料】
高尿酸血症治療薬
Drug Information

		第1推奨	第2推奨	—
成分名		フェブキソスタット	アロプリノール	トピロキソスタット
効能効果		○ 痛風、高尿酸血症 ○ がん化学療法に伴う高尿酸血症	○ 痛風、高尿酸血症をともなう高血圧症	○ 痛風、高尿酸血症
用法用量		1回40mg 1日1回	1回100mg 1日2～3回	1回20mg 1日2回
1日薬価	最高(先発品)	¥55.40	¥11.8～¥35.4	¥30.80
	最低	¥20.80	¥8.0～¥24.0	—
がん化学療法に伴う高尿酸血症の適応		あり	なし	なし
併用禁忌		あり (メルカプトプリン水和物又はアザチオプリンを投与中の患者)	なし	あり (メルカプトプリン水和物又はアザチオプリンを投与中の患者)
重大な副作用(皮膚障害)		なし	あり (中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、剥脱性皮膚炎等の重篤な皮膚障害又は過敏性血管炎)	なし
重大な副作用(腎不全、腎不全の増悪、間質性肺炎を含む腎障害)		なし	あり (投与量の減量や投与間隔の延長を考慮。特に腎不全患者に副作用が発現した場合は重篤な転帰をたどることがある)	なし
心血管患者に対する記載		あり (心血管疾患の増悪や新たな発現に注意)	なし	なし
口腔内崩壊錠(OD錠)の有無		あり	なし	なし